

Protegete i vostri volatili contro l'influenza aviaria

Molte persone allevano pollame ed altri tipi di volatili, e mentre il rischio che l'influenza aviaria raggiunga le nostre coste è abbastanza limitato, tutti i proprietari di volatili devono stare attenti ad eventuali sintomi della malattia.

La malattia viene trasmessa tramite contatto diretto, morsi o graffi fra gli animali. Aria, escrementi, abiti, calzature, pelle, muco, lenzuola, cibo, mangimi e contenitori d'acqua, veicoli, attrezzature, carne ed uova contaminati possono essere tutti portatori del contagio.

Queste semplice precauzioni possono proteggere i vostri volatili dalla malattia.

Evitate la contaminazione di acqua e mangimi

I vostri volatili non correranno rischi se terrete le scorte d'acqua e di mangime al riparo da uccelli e animali selvatici. Conservate il cibo in contenitori sigillati e ripulite sempre eventuali fuoriuscite di alimenti o liquidi. L'acqua alla quale hanno accesso uccelli selvatici presenta un elevatissimo rischio di contagio. Usate esclusivamente acqua del rubinetto o di pozzo. Se questa non fosse disponibile, trattate l'acqua con il cloro.

Evitate il contatto con uccelli selvatici

Uccelli selvatici e animali nocivi possono essere portatori di numerose malattie. Non permettete che i vostri volatili entrino in contatto con uccelli selvatici. Usate reti o recinti per tenere lontani gli uccelli selvatici, e rimuovete ogni oggetto che possa attrarre tali uccelli come cibo, pozze d'acqua e giacigli per i polli. Inoltre, non consentite loro l'accesso a stagni aperti, laghi e ruscelli.

Tenete pulito

Pulite regolarmente voliere, gabbie e pollai e disinfettate le attrezzature e i contenitori di acqua e mangimi. Non condividete le attrezzature con altri avicoltori e lavate sempre accuratamente le mani, i vestiti e le scarpe con acqua calda e sapone prima e dopo qualsiasi contatto con i volatili.

Seguite buone regole d'igiene alle fiere

Se vi recate a fiere aviarie, non consentite ai vostri volatili di entrare in contatto diretto con altri volatili e lavate sempre accuratamente le mani con acqua calda e sapone prima e dopo il contatto con altri volatili. Evitate di acquistare uccelli a mercati o fiere. Una volta tornati a casa, tenete isolati i volatili da fiera per 10 giorni prima di unirli nuovamente agli altri.

Limitate il contatto dei vostri volatili con visitatori

L'infezione può essere trasmessa attraverso le mani, i vestiti e le calzature. Se è necessario il contatto, assicuratevi che i visitatori si lavino accuratamente le mani con acqua calda e sapone prima di toccare i vostri uccelli.

Tenete i nuovi uccelli in quarantena

Per evitare la trasmissione del contagio ai vostri volatili, pulite, separate e tenete sotto controllo gli uccelli nuovi, quelli da fiera o da corsa per 10 giorni prima di unirli agli altri volatili. Acquistate i volatili sempre da un rivenditore affidabile ed evitate di acquistarli ai mercati. Assicuratevi di conoscere lo stato di salute di tutti i volatili che acquistate o trasferite.

Riconoscete i sintomi della malattia

Tenete d'occhio e ispezionate regolarmente i vostri uccelli. Se **molti** dei vostri volatili si ammalano o muoiono, riferitelo immediatamente.

I sintomi più comuni della malattia comprendono:

- * piume arruffate
- * incapacità di camminare o mantenere una posizione eretta
- * insolita posizione della testa o del collo
- * aria abbattuta
- * riluttanza a muoversi, mangiare o bere
- * stress respiratorio
- * diarrea
- * testa, bargigli o cresta tumefatti
- * diminuzione nella produzione di uova
- * morte improvvisa di molti uccelli.

Denunciate la presenza di uccelli malati o morti chiamando il numero 1800 675 888

Se molti dei vostri volatili mostrano sintomi insoliti di malattia, comportamento anormale o se muoiono inaspettatamente, riferitelo immediatamente alla *hotline* del servizio di Emergenza Malattie Animali al numero gratuito **1800 675 888**. Altrimenti riferitelo al vostro veterinario locale o al locale dipartimento delle industrie primarie o dell'agricoltura.

Tutte le specie di volatili sono suscettibili al contagio dell'influenza aviaria, che ha dimostrato di manifestarsi in oltre 140 specie. L'influenza aviaria è una malattia che va denunciata.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.daff.gov.au/birdflu